



## Classificatie lymfoedeem

### ISL-stadia

Stadium 0	Subklinisch stadium, geen zwelling zichtbaar ondanks verminderd lymfetransport: dit stadium kan maanden of jaren bestaan voordat lymfoedeem manifest wordt
Stadium I	Accumulatie van interstitieel vocht, wat vermindert door hoog leggen. In dit stadium kan het oedeem pitting zijn
Stadium II	Hoog leggen vermindert nauwelijks de zwelling en het oedeem is duidelijk pitting
Laat stadium II	Pitting is duidelijk aanwezig door fibrosevorming in het
Stadium III	Het weefsel voelt hard aan (fibrotisch) en pitting is niet meer aanwezig. Er treden huidveranderingen op als verdikking, hyperpigmentatie, meer huidplooiën, vetdeposito en wratachtige woekeringen

\* Stadia van lymfoedeem volgens de 'International Society of Lymphology' (International Society of Lymphology. The diagnosis and treatment of peripheral lymphedema. 2009 Consensus Document of the International Society of Lymphology. Lymphology. 2009 Jun;42(2):51-60.)

### Een andere gangbare classificatie is

0 – 10 % verschil	gering of pre-oedeem
10 – 20 %	matig oedeem
20 – 40 %	sterk oedeem
40 – 80 %	massief oedeem
80 – 160 %	elephantiasis-oedeem
160 % of meer	monstrueus oedeem